

คำแนะนำ

ส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น Esophagogastroduodenoscopy (EGD)

อาการของผู้ป่วยที่ควรได้รับการตรวจ

1. มีอาการกลืนอาหารลำบาก กลืนติด หรือกลืนเจ็บ
2. จุกแน่นหรือปวดท้องบริเวณลิ้นปี่
3. อาเจียนต่อเนื่องหลังรับประทานอาหาร
4. อาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายอุจจาระเป็นสีดำเหลว
5. น้ำหนักตัวลดลงไม่ทราบสาเหตุ
6. โลมืดจางไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีประวัติรับประทานยาแก้ปวด

การเตรียมตัวก่อนรับการส่องกล้องตรวจ

1. ผู้มีโรคประจำตัวหรือแพ้ยาควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
2. กรณีรับประทานยาละลายลิ่มเลือดให้หยุดยาก่อนวันนัดตรวจ 7 วัน
- 3.งดอาหาร ตั้งแต่หลังเที่ยงคืน จนถึงเวลาตรวจ ไม่สามารถมาได้โทรแจ้งล่วงหน้า
4. พยาชาติที่สามารถขับรถ (กรณีขับรถมา) หรือญาติที่สามารถพาผู้ป่วยกลับบ้านได้มาด้วย
5. กรุณาถอดฟันปลอม ล้างเล็บสี หรือเล็บเจล คอนแทคเลนส์
6. ไม่สวมใส่เครื่องประดับ ของมีค่า

ขั้นตอนการส่องกล้องตรวจ

1. ผู้ป่วยจะได้รับยาชาเฉพาะที่บริเวณลำคอ หรือ ให้ยาระงับปวด ระงับความรู้สึก ทางหลอดเลือดดำ
2. ทำในการตรวจ ผู้ถูกตรวจนอนตะแคงซ้าย
3. แพทย์จะส่องกล้องเข้าทางปากโดยผู้ป่วยควรช่วยกลืนเมื่อกำลังเข้าไปถึงบริเวณคอหอย

ข้อควรปฏิบัติภายหลังการส่องกล้องตรวจ

1. งดน้ำและอาหารขณะนอนพักฟื้นประมาณ 1-2 ชั่วโมง จากการได้ยากล่อมประสาท, ยาแก้ปวด, และเพื่อสังเกตอาการ
2. หลังยาชาเฉพาะที่หมดฤทธิ์ซึ่งผู้ป่วยจะเริ่มรู้สึกว้าคอหายชา ให้ลองจิบน้ำได้
3. ผู้ป่วยอาจมีอาการเจ็บในคอ, ท้องอืด หรือบ้วนน้ำลายแล้วมีเลือดปนได้เล็กน้อยภายหลังการส่องกล้อง
4. ถ้ามีอาการแน่นหน้าอก/ปวดท้องลิ้นปี่มาก หรือบ้วนน้ำลาย /อาเจียนมีเลือดปนปริมาณมาก ให้รีบมา sw.

ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต